

REACTUP



*Le site à
fréquenter
avant de
baiser !*

Author: emchateau

Plus d'IST chez les gays qui font des lavements

Attention ! Ce contenu a 11 ans. Merci de lire cette page en gardant son âge en tête.

Une étude récente présentée à la conférence nationale américaine sur les [IST](#) à Atlanta met en évidence une association entre la pratique du lavement (douche rectale) et la [prévalence](#) des IST chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.

D'un âge moyen de 40 ans (18-72 ans), les hommes sur lesquels portait l'enquête avaient une médiane de 2 partenaires au cours des 30 jours précédents (IQR : 1-3).

8% d'entre eux étaient porteurs d'une [gonorrhée](#) rectale ou étaient porteurs d'une [syphilis](#) récente. Parmi les hommes infectés par une [Infection](#) Sexuellement Transmissible (IST), 56% rapportaient avoir pratiqué un lavement avant leur dernier rapport sexuel tandis que seulement 20% des hommes qui n'étaient pas porteurs d'une IST rapportaient cette pratique (lavements était significativement associé avec la prévalence d'IST en analyse multivariée (OR : 5.3 ; 95% CI : 1.7-16.6) alors que le nombre de partenaires, l'âge ou l'utilisation du [préservatif](#) lors du dernier rapport réceptif n'était pas significatifs.

Les auteurs suggèrent que les hommes ayant des rapports sexuels devraient être informés des risques potentiels des lavements concernant le risque d'acquisition d'IST et sur la nécessité d'utiliser des préservatifs.

Source : [Kristen Hess et al. " Prevalent Sexually Transmitted Infections in Men Who Have Sex with Men Is Associated with Rectal Hygiene Practices ". National STD Prevention Conference 2010, B7a](#)

Date: 13-03-2010